

Монгольская жаба на Ольхоне и в Приольхонье

Н.И. Литвинов

Впервые монгольская жаба *Bufo raddei* Strauch, 1876 указана для байкальского побережья в 1960 г. /Литвинов, Гаврилова, 1960/. Более подробные сведения о распространении этого вида в Прибайкалье опубликованы Н.И.Литвиновым и Ю.Г.Швецовым /1967/. В первой из названных работ было подчеркнуто, что жаба не обитает на Ольхоне, хотя на материковом берегу Ольхонских ворот она найдена. Об отсутствии амфибий, а следовательно, и монгольской жабы в фауне Ольхона говорилось и в других работах автора /Литвинов, 1972/.

В августе 1976 г. мы нашли /добыли несколько экземпляров/ монгольскую жабу на Ольхоне, на берегу бухты Загли. Теперь можно говорить, что в фауне Ольхона имеются представители всех четырех классов наземных позвоночных.

Обычна монгольская жаба в районе устья р.Сармы и одноименной деревни на западном берегу Малого моря. Указал на это зоолог Ю. Дурнев, а затем мы и сами наблюдали здесь этих амфибий.


Участок ареала на Ольхоне и западном берегу Байкала /Приольхонье/ находится не менее чем в 100 км от устья Селенги, где обитание монгольской жабы установлено Ю.Г.Швецовым /1963/. От северной границы ареала в районе Байкала, как ее проводят авторы герпетологических сводок /Терентьев и Чернов, 1949; Банников, Даревский, Рустамов, 1971/, он находится еще дальше /см. карту/. К тому же между границей сплошного ареала в этом районе и описываемым местообитанием лежит Байкал. От границы ареала в левобережье верхнего течения Ангары до Сармы и Ольхона не менее 200 км.

Мы считаем, что степи Ольхона и западного побережья Байкала - плиоценовый реликт. Монгольская жаба - один из элементов оiocеноза этих реликтовых степей.

Л и т е р а т у р а

- Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся СССР. М., "Мысль", 1971, с. 303.
Литвинов Н.И., Гаврилова И.С. К распространению монгольской жабы. Изв. Иркутского СХИ. Вып. 18. Иркутск, 1960, с. 241.
Литвинов Н.И., Швецов Ю.Г. Заметки о распространении и экологии земноводных и пресмыкающихся Прибайкалья. Изв. Иркутского СХИ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ЖАБЫ



- ? северная граница ареала
 в районе Байкала
 ▲ местообитание в дельте Селенги (Швецов, 1963)
 ● наши находки

Вып. 25. Иркутск. 1967, с. 232-243.

Литвинов Н.И. Заметки о фауне наземных позвоночных островов Байкала. Тр. Иркутского СХИ "хозяйственное использование и воспроизводство охотничьей фауны. Экология животных". Иркутск, 1972, с. 57-87.

Терентьев П.В., Чернов С.А. Определитель пресмыкающихся и земноводных. М., "Советская наука", 1949, с. 339.

Швецов Ю.Г. Земноводные и пресмыкающиеся дельты р. Селенги. /Юго-восточное Прибайкалье/. Зоолог. журнал. Т. 42. Вып. II. М., 1963, с. 1735-1736.